Hypermed Care

Leziuni

Eficienta terapeutica dovedita

Terapie cu oxigen hiperbar

- Ulcere venoase
- Picior diabetic
- Leziuni post-chirurgicale
- Boala arteriala periferica
- Arsuri
- Escare
- Flapsuri si grefe de piele
- Malformații arterio ulcerative

Nu are efecte adverse



Oxigenarea hiperbara este o terapie sigura si non-invaziva

www.biobarica.com

In cazul leziunilor, oxigenul hiperbar diluat în plasma sanguină in doze mari este utilizat imediat de către celule, ajungând in acele țesuturi unde perfuzia este compromisa. O difuzie mai mare de O2 în țesuturi accelerează semnificativ tratamentul de vindecare.

Aplicatii specifice ale TOHB in procesul de vindecare a leziunilor

Etapa inflamatorie

Reducerea inflamației
Reglarea stresului oxidativ
Stimularea imunitatii mediate celular
Limitarea infectiilor

Etapa de granulare

Stimulare fibroplastica
Angiogeneza
Formarea matrixului de colagen

Proliferare


Remodelare tisulara
Neovascularizare
Epitelizare

Evolutia tratamentului


Pacient: Femeie, 90 ani
Diagnostic: escara
Numar de sedinte: 35



Pacient: Barbat, 60 ani
Diagnostic Piciorul drept - ulcer ischemic / artrita reumatoida
Numar de sedinte: 40



Pacient: Femeie, 11 ani
Diagnostic: Trauma
Numar de sedinte: 40



Pacient: Barbat, 60 ani
Diagnostic: Leziune post-chirurgicala cardiaca
Numar de sedinte: 35



Patologie	Numar de cazuri	Eficienta terapeutica	Numar mediu de sedinte prescrise	% sedinte efectuate	Satisfactia pacientului	Durata medie a sedintei	Evolutia pacientului
Abs	25	96%	40	93%	88%	61 min	98%
Ulcere venoase	143	92%	60	97%	96%	64 min	94%
Leziuni post-chirurgicale	32	95%	20	100%	91%	62 min	95%
Picior diabetic	77	89%	60	91%	87%	67 min	91%